
















31 de març de 2021

Taula comparativa administració de les vacunes



	Pfizer / BioNTech	Moderna / Lonza	Oxford / AstraZeneca
 Aprovació i ordre per part de l'Agència Europea del Medicament	Primera 23 de desembre de 2020	Segona 6 de gener de 2021	Tercera 29 de gener de 2021
 Ubicació del Laboratori o tecnologia	EEUU i Alemanya	EEUU i Suïssa	Regne Unit
 Nom comercial	Comirnaty	Vacuna Moderna COVID-19	Vacuna AstraZeneca COVID-19
 Plataforma o tecnologia	ARNm que codifica la proteïna S encapsulada en nanopartícules lipídiques	ARNm que codifica la proteïna S encapsulada en nanopartícules lipídiques	Virus atenuat modificat genèticament
 Presentació	Vials multidosis amb 0,45 ml d'una solució concentrada que és necessari diluir amb 1,8 ml de sèrum salí a l'0,9% abans del seu ús, el que proporciona una quantitat suficient per obtenir a l'almenys 6 dosis de 0,3 ml per cada vial	Vials multidosis que contenen 10 dosis de 0,5 ml per vial	Vials multidosis que contenen 10 dosis de 0,5 ml per vial
 Dissolució	Sí	No	No
 Protecció davant la COVID-19	95% 7 dies després de la segona dosi	94,5% 14 dies després de la segona dosi	81,3% amb la segona dosi, 12 setmanes o més després de la primera
 Número de dosis per arribar a la pauta de vacunació completa	Dues dosis amb un interval de 21 dies	Dues dosis amb un interval de 28 dies	Dues dosis amb un interval d'entre 70 o 84 dies
 Franja d'edat d'administració	Majors de 18 anys	Majors de 18 anys	De 18 fins 65 anys
 Contraindicada o no recomanada	<ul style="list-style-type: none">• Persones amb al·lèrgies greus• Embarassades	<ul style="list-style-type: none">• Persones amb al·lèrgies a algun dels components de la vacuna.• Embarassades	<ul style="list-style-type: none">• Ciutadans de 66 anys o més• Persones amb patologies greus o de risc• Embarassades
 Temperatura de refrigeració	Entre 2 °C i 8 °C durant un màxim de 5 dies	Entre 2 °C i 8 °C durant un màxim de 30 dies	Entre 2 °C i 8 °C durant un màxim de 6 mesos
 Temperatura de congelació	Entre -90 °C i -60 °C	Entre -25 °C i -15 °C	No es congela
 Efectes secundaris més habituals	Dolor al lloc de la injecció (84%); fatiga o sensació de cansament (63%); mal de cap (55%); miàlgies (38%); calfreds (32%); artràlgies (24%); febre (14%)	Dolor al lloc de la injecció (92%); fatiga o sensació de cansament (70%); mal de cap (61%); miàlgies (61%); artràlgies (46%); calfreds (45,5%); nàusees (23%); febre (15%).	Sensibilitat al lloc de la injecció (63,7%); dolor al lloc de la injecció (54,2%); mal de cap (52,6%); fatiga (53,1%); miàlgia (44%); malestar (44,2%); pirèxia (inclou febre [33,6%] i febre > 38 °C [7,9%]); calfreds (31,9%); artràlgia (26,4%), i nàusees (21,9%)
 Número de dosis compromeses per la Unió Europea	300 milions de dosis	160 milions de dosis	400 milions de dosis
 Cost pel Sistema de Salut (gratuïtes pel ciutadà)	15€	30€	3€

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/vacunacio-professionals