



INFORMACIÓ SOBRE VACUNES PER A LES FAMÍLIES (INFANTS)

Com a pediatres, informem que els Consells Assessors de les Societats Científiques de diferents països recomanen l'administració de **vacunes no incloses dins del calendari vacunal del "Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud"** i **no finançades pel Servei Català de la Salut**, en el moment actual.

1. Vacuna contra el Rotavirus. *Rotarix[®] Rotateq[®]*,

El Rotavirus és la principal causa d'hospitalització per diarrea en els primers anys de vida i afecta, si més no, una vegada a tots els nens menors de 5 anys. La complicació més freqüent és la deshidratació. La infecció per rotavirus ha estat relacionada també amb les convulsions febrils.

Les vacunes disponibles contra el rotavirus han demostrat la seva seguretat i eficàcia en països desenvolupats. *Rotarix[®] Rotateq[®]*, són d'administració oral i les pautes de vacunació són diferents.

Consulteu la pauta de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a de pediatria. Actualment està finançada per a prematurs de < 32 sg.

2. Vacuna contra el Meningococ tipus B: *Bexsero[®], Trumenba[®]*

El Meningococ és un bacteri que pot causar meningitis i/o una infecció generalitzada a tot el cos, anomenada sèpsia. Pot presentar una clínica fulminant, amb mortalitat elevada i seqüeles neurològiques. Afecta principalment a nens petits i a adolescents. La incidència en el nostre país és baixa.

Existeixen dos vacunes disponibles, *Bexsero[®]* (a partir dels 2 mesos) i *Trumenba[®]* (a partir dels 10 anys), que han demostrat seguretat i eficàcia.

Consulteu la pauta de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a de pediatria.

3. Vacuna tetravalent contra els Meningococs ACWY: *Menveo*[®], *Nimenrix*[®].

Aquests tipus de Meningococs també poden causar meningitis i/o sèpsia. Alguns Comitès de vacunes de les Societats Científiques Pediàtriques recomanen la vacunació amb vacuna tetravalent als 12 mesos i 12 anys. El SNS ha aprovat l'administració, de forma finançada, de la dosi dels 12 anys.

La vacuna *Menveo*[®] es pot posar a partir dels 24 mesos i *Nimenrix*[®] a partir de les 6 setmanes de vida

Consulteu la pauta de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a de pediatria.

Si voleu més informació, parleu amb el vostre pediatre. Trobareu més informació del *Comité Asesor de Vacunas* de la AEP a la següent pàgina web: www.vacunasaep.org

Si voleu administrar aquestes vacunes, recordeu demanar la recepta al vostre pediatre. Es necessària perquè us lliurin la vacuna a la farmàcia.

juliol de 2021



INFORMACIÓ SOBRE VACUNES PER A LES FAMÍLIES (ADOLESCENTS)

Com a pediatres, informem que els Consells Assessors de les Societats Científiques de diferents països recomanen l'administració de **vacunes no incloses dins del calendari vacunal del "Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud"** i **no finançades pel Servei Català de la Salut en el moment actual.**

1. Vacuna contra el Meningococ tipus B: *Bexsero*[®], *Trumenba*[®]

El Meningococ és un bacteri que pot causar meningitis i/o una infecció generalitzada a tot el cos, anomenada sèpsia. Pot presentar una clínica fulminant, amb mortalitat elevada i seqüeles neurològiques. Afecta principalment a nens petits i a adolescents. La incidència en el nostre país és baixa.

Existeixen dues vacunes disponibles, *Bexsero*[®] (a partir dels 2 mesos) i *Trumenba*[®] (a partir dels 10 anys), que han demostrat seguretat i eficàcia.

Consulteu la pauta de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a de pediatria.

2. Vacuna tetravalent contra dels Meningococs ACWY: *Menveo*[®], *Nimenrix*[®].

Aquests tipus de Meningococs també poden causar meningitis i/o sèpsia. Alguns comitès de vacunes de les Societats Científiques Pediàtriques recomanen la vacunació amb vacuna tetravalent als 12 mesos i 12 anys. El SNS ha aprovat l'administració, de forma finançada, de la dosi dels 12 anys.

La vacuna *Menveo*[®] es pot posar a partir dels 24 mesos i *Nimenrix*[®] a partir de les 6 setmanes de vida

Consulteu la pauta de vacunació amb el vostre pediatre/infermera de pediatria.

3. Vacuna en contra el virus del papil·loma humà (VPH): Gardasil9® i Cervarix®.

La infecció per aquest virus està relacionada amb berrugues genitals, lesions precanceroses de l'àrea genital, anal i orofaríngia. La vacuna Gardasil9® és la que actualment s'administra a Catalunya, de forma finançada, a totes les noies a partir dels 11 anys i persones amb risc de contagi. S'ha demostrat segura i eficaç.

La recomanació de la vacunació s'estén als nois per disminuir la transmissió del virus i protegir-los enfront les malalties causades pel VPH.

Consulteu la pauta de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a de pediatria.

Si voleu més informació, parleu amb el vostre pediatre. També podeu consultar la informació del *Comité Asesor de Vacunas* de la AEP a la següent pàgina web: www.vacunasaep.org

Si voleu administrar aquestes vacunes, recordeu demanar la recepta al vostre pediatre. Es necessària perquè us lliurin la vacuna a la farmàcia.

juliol de 2021