

Vacuna COVID-19 Oxford /AstraZeneca - Vaxzevria



Com actua?

- Utilitza un virus atenuat i modificat genèticament (adenovirus).
- Produeix immunitat a partir de la reacció del cos a les proteïnes del virus.
- Eficàcia del 81,3% amb la segona dosi.



Presentació i conservació

- Vials multidosi de 10 dosis de 0,5 ml.
- Mantenir entre els 2 °C i els 8 °C.
- No s'ha de congelar.
- No s'ha de diluir.



A qui es pot administrar?

Indicada

- De 60 fins a 69 anys*.
- *Edat acordada a l'Estat espanyol .


Contraindicada

- Hipersensibilitat greu a alguna dosi prèvia o algun dels components.



Administració

- Intramuscular en el deltoides.
- Dues dosis de 0,5 ml.
- Interval entre dosis: 4 setmanes.



Efectes adversos

- Reportar-los al sistema de farmacovigilància.
- Es resolen pocs dies després de la vacunació, són lleus o moderats, i es pot fer servir tractament simptomàtic:
 - Sensibilitat o dolor al lloc de la injecció
 - Febre o febrícula
 - Fatiga
 - Maldecap
 - Calfreds
 - Nàusees
 - Dolor articular o muscular

* S'ha descrit un efecte advers molt rar i potencialment molt greu: trombosis associada a trombocitopènia, sobre tot en persones menors de 60 anys.

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/vacuna-astrazeneca

Vacuna COVID-19 Pfizer/BioNTech - Comirnaty



Com actua?

- Utilitza ARN missatger basat en el genoma de la COVID-19.
- Produeix immunitat combinada: humoral i cel·lular.
- Eficàcia del 95%, 7 dies després de la segona dosi



Presentació i conservació

- Vial multidosi amb els que s'obtenen 6 dosis de 0,3 ml.
- Cada vial s'ha de diluir amb 1,8 ml de sèrum salí al 0,9%.
- Conservar a -70 °C, màxim 9 mesos.
- Es poden transportar sense obrir entre -25 °C i -15 °C, màxim 2 mesos.
- Descongelar abans de la dilució. Pot estar entre 2 °C i 8 °C durant 1 mes.
- Abans d'utilitzar, el vial pot conservar-se a menys de 30 °C un màxim de 2 hores.
- **No s'ha de tornar a congelar.**



A qui es pot administrar?

Indicada

- Des dels 12 anys.

Contraindicada

- Hipersensibilitat greu a alguna dosi prèvia o algun dels components.



Administració

- Intramuscular.
- Dues dosis de 0,3 ml.
- Interval entre dosis: almenys 3 setmanes (21 dies).



Efectes adversos

- Reportar-los al sistema de farmacovigilància.
- Es resolen pocs dies després de la vacunació, són lleus o moderats, i es pot fer servir tractament simptomàtic:
 - Sensibilitat o dolor al lloc de la injecció
 - Febre o febrícula
 - Fatiga
 - Maldecap
 - Calfreds
 - Nàusees
 - Dolor articular o muscular

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/vacuna-pfizer

Vacuna COVID-19

Moderna/Lonza - Spikevax



Com actua?

- Utilitza ARN missatger basat en el genoma de la COVID-19.
- Produeix immunitat combinada: humoral i cel·lular.
- Eficàcia del 94,5%, 14 dies després de la segona dosi.



Presentació i conservació

- Vial multidosi amb 10 dosis de 0,5 ml.
- Conservar entre -25 °C i -15 °C durant 7 mesos.
- Sense obrir, conservar entre 2 °C i 8 °C 30 dies o a temperatura ambient, entre 15 °C i 25 °C durant 1 hora.
- Descongelada, mantenir a temperatura ambient entre 8 °C i 25 °C durant 24 hores o entre 2 °C i 8 °C durant 30 dies.
- Perforat el vial, conservar entre 2 °C i 25 °C un màxim de 19 hores.
- Transportar els vials entre -25 °C i -15 °C. Descongelats, transportar entre 2 °C i 8 °C durant 12 hores.
- **No s'ha de tornar a congelar.**



A qui es pot administrar?

Indicada

- Des dels 12 anys.


Contraindicada

- Hipersensibilitat greu a alguna dosi prèvia o algun dels components.



Administració

- Intramuscular en el deltoide o múscul vast de la cuixa.
- Dues dosis de 0,5 ml.
- Interval entre dosis: almenys 4 setmanes (28 dies)



Efectes adversos

- Reportar-los al sistema de farmacovigilància.
- Es resolen pocs dies després de la vacunació, són lleus o moderats, i es pot fer servir tractament simptomàtic:
 - Sensibilitat o dolor al lloc de la injecció
 - Febre o febrícula
 - Fatiga
 - Maldecap
 - Calfreds
 - Nàusees
 - Dolor articular o muscular

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/vacuna-moderna

Vacuna COVID-19 Johnson & Johnson / Janssen



Com actua?

- Adenovirus humà del refredat comú (adenovirus 26) sense capacitat de replicació.
- Produeix immunitat a partir de la reacció del cos a les proteïnes del virus.
- Eficàcia del 66,9% amb una única dosi.



Presentació i conservació

- Vials multidosi (almenys de 5 dosis).
- Conservar entre 2 °C i 8 °C.
- Caducitat de 3 mesos.
- Es pot conservar fins a 12 hores sense refrigerar.
- Una vegada perforat el vial s'ha d'administrar durant les 3 hores següents.



A qui es pot administrar?

Indicada

- Des dels 18 anys.


Contraindicada

- Hipersensibilitat greu a alguna dosi prèvia o algun dels components.



Administració

- Intramuscular en el deltoide o múscul vast de la cuixa.
- Una única dosi.



Efectes adversos

- Reportar-los al sistema de farmacovigilància.
- Es resolen pocs dies després de la vacunació, són lleus o moderats, i es pot fer servir tractament simptomàtic:
 - Sensibilitat o dolor al lloc de la injecció
 - Febre o febrícula
 - Fatiga
 - Maldecap
 - Calfreds
 - Nàusees
 - Dolor articular o muscular

* S'ha descrit un efecte advers molt rar i potencialment molt greu: trombosis associada a trombocitopènia, sobre tot en persones menors de 60 anys.

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/vacuna-janssen