



INFORMACIÓ SOBRE VACUNES PER A LES FAMÍLIES (INFANTS)

Com a pediatres, informem que els Consells Assessors de les Societats Científiques de diferents països recomanen l'administració de **vacunes no incloses dins del calendari vacunal** del "Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" i **no finançades** pel Servei Català de la Salut, en el moment actual.

1. **Vacuna contra el Rotavirus.** *Rotarix® Rotateq®*,

El Rotavirus és la principal causa d'hospitalització per diarrea en els primers anys de vida i afecta, si més no, una vegada a tots els nens menors de 5 anys. La complicació més freqüent és la deshidratació. La infecció per rotavirus ha estat relacionada també amb les convulsions febrils.

Les vacunes disponibles contra el rotavirus han demostrat la seva seguretat i eficàcia. *Rotarix® Rotateq®*, son d'administració oral i les pautes de vacunació son diferents.

Actualment està finançada per a prematurs.

2. **Vacuna contra el Meningococ tipus B:** *Bexsero®, Trumenba®*

El Meningococ B és un bacteri que pot causar meningitis i/o una infecció generalitzada a tot el cos, anomenada sèpsia. Pot presentar una clínica fulminant, amb mortalitat elevada i seqüeles neurològiques. Afecta principalment a nens petits i adolescents. La incidència en el nostre país és baixa.

Existeixen dos vacunes disponibles, *Bexsero®* (a partir dels 2 mesos) i *Trumenba®* (a partir dels 10 anys), que han demostrat seguretat i eficàcia.

3. **Vacuna tetravalent contra els Meningococs ACWY:** *Menveo®, Nimenrix®, MenQuadfi®*.

Aquests tipus de Meningococs també poden causar meningitis i/o sèpsia. Alguns Comitès de vacunes de les Societats Científiques Pediàtriques recomanen la vacunació amb vacuna tetravalent als 12 mesos i 12 anys. El SNS ha aprovat l'administració, de forma finançada, de la dosi dels 12 anys.

La vacuna *Nimenrix®* es pot administrar a partir de les 6 setmanes de vida, *MenQuadfi®* a partir dels 12 mesos i *Menveo®* a partir dels 24 mesos.

Si voleu més informació, parleu amb la vostre pediatra. També podeu consultar la informació del *Comité Asesor de Vacunas* de la AEP a la següent pàgina web: www.vacunasaep.org

Si voleu administrar aquestes vacunes, recordeu demanar la recepta al vostre pediatre. És necessària perquè a us lliurin la vacuna a la farmàcia.

Consulteu sempre les pautes de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a de pediatria.

Desembre 2021



INFORMACIÓ SOBRE VACUNES PER A LES FAMÍLIES (ADOLESCENTS)

Com a pediatres, informem que els Consells Assessors de les Societats Científiques de diferents països recomanen l'administració de **vacunes no incloses dins del calendari vacunal** del "Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" i **no finançades** pel Servei Català de la Salut en el moment actual.

1. **Vacuna contra el Meningococ tipus B:** *Bexsero®*, *Trumenba®*

El Meningococ B és un bacteri que pot causar meningitis i/o una infecció generalitzada a tot el cos, anomenada sèpsia. Pot presentar una clínica fulminant, amb mortalitat elevada i seqüeles neurològiques. Afecta principalment a nens petits i adolescents. La incidència en el nostre país és baixa.

Existeixen dues vacunes disponibles, *Bexsero®* (a partir dels 2 mesos) i *Trumenba®* (a partir dels 10 anys), que han demostrat seguretat i eficàcia.

2. **Vacuna tetravalent contra els Meningococs ACWY:** *Menveo®*, *Nimenrix®*, *MenQuadfi®*.

Aquests tipus de Meningococs també poden causar meningitis i/o sèpsia. Alguns Comitès de vacunes de les Societats Científiques Pediàtriques recomanen la vacunació amb vacuna tetravalent als 12 mesos i 12 anys. El SNS ha aprovat l'administració, de forma finançada, de la dosi dels 12 anys.

La vacuna *Nimenrix®* es pot administrar a partir de les 6 setmanes de vida, *MenQuadfi®* a partir dels 12 mesos i *Menveo®* a partir dels 24 mesos.

3. **Vacuna en contra el virus del Papil·loma humà (VPH):** *Gardasil®*, *Cervarix®* i *Gardasil9®*

La infecció per aquest virus està relacionada amb berrugues genitals, càncer de l'àrea genital, anal i d'orofaringe. La vacuna *Gardasil9®* es la que actualment s'administra a Catalunya, de forma finançada, a totes les noies a partir dels 11 anys i persones amb risc de contagi. S'ha demostrat segura i eficaç.

La recomanació de la vacunació s'estén als nois per disminuir la transmissió del virus i protegir-los enfront les malalties causades pel VPH.

Si voleu més informació, parleu amb la vostra pediatra. També podeu consultar la informació del *Comité Asesor de Vacunas* de la AEP a la següent pàgina web: www.vacunasaep.org

Si voleu administrar aquestes vacunes, recordeu demanar la recepta al vostre pediatre. És necessària perquè a us lliurin la vacuna a la farmàcia.

Consulteu sempre les pautes de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a de pediatria.

Desembre 2021